

Zwei neue Trichodes-Arten.

Von **Edm. Reitter** in Paskau.

Trichodes suturangulus n. sp.

Dem *Tr. turkestanicus* Kr. äusserst nahe verwandt, aber der Thorax ist viel stärker und dichter quer gerunzelt, die Spitze der Decken ist ausgebuchtet, der Suturalwinkel lang dornförmig vorgezogen und die Hinterschenkel des ♂ sind zwar schwach, aber viel deutlicher als bei *turkestanicus* verdickt. Die Flügeldecken sind grün, die Schulterbeule, eine Binde in der Mitte, welche sich nach innen verengt, daher einen conischen, mit dem gelben Seitenrande verbundenen Flecken darstellt, der aber die Naht nicht erreicht, sowie eine gebogene, durch die grüne Naht unterbrochene Querbinde vor der Spitze roth.

Bei *turkestanicus* ist die Spitze der Flügeldecken entweder gemeinschaftlich abgerundet und der Nahtwinkel daher rechteckig oder einzeln abgerundet. Beide Formen zeigen auch einige weitere Verschiedenheiten, in der Stärke der Punktur auf den dunklen Stellen der Flügeldeckenscheibe. Länge 9 bis 15 mm. Araxesthal bei Ordubad.

Trichodes guttifer n. sp.

Ebenfalls dem *turkestanicus* ungemein nahe verwandt, aber durch die auf wenige kleine Flecken reducirten Binden diesem gar nicht ähnlich; trotzdem ist es nicht unmöglich, dass er specifisch zum *turkestanicus* gehört. Leider besitze ich blos ein ♀ und bleibt diese Frage vorläufig unentschieden.

Grün metallisch, greis behaart, Fühler gelb, Halsschild quer, fein gerunzelt, Flügeldecken miniumroth, parallel und oben abgeflacht, Spitze gemeinschaftlich abgerundet, die Naht am Schildchen und an der Spitze etwas makelartig erweitert, ein kleiner Schrägfleck vor und ein quer conischer hinter der Mitte, beide von der Naht und vom Seitenrande gleichweit entfernt, stahlblau. Punktur dicht und mässig grob, vorne allmählig feiner werdend. Länge 11·5 mm.

Ein ♀ aus Turkmenien, von D. Walter aufgefunden.